

**B. NOTICE**

**NOTICE****Drontal® Dog Flavour****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Bayer SA-NV  
J.E. Mommaertslaan 14  
B-1831 Diegem (Machelen)

Fabricant responsable de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel  
Allemagne

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Drontal® Dog Flavour****3. LISTE DU SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS**

Par comprimé :

**Principes actifs:**

Embonate de pyrantel	144 mg
Fébantel	150 mg
Praziquantel	50 mg

**Excipients:**

Amidon de maïs – Lactose – Cellulose microcristalline – Stéarate de magnésium – Sodium dodécylsulphate – Dioxyde de silicium à haute dispersion – Povidone – 'Beef flavour' artificiel q.s.p. tableta compr. una.

**4. INDICATIONS**

Vermifuge pour chiens.

- Traitement des infestations mixtes de nématodes et cestodes chez le chien comme:

Spectre	Espèces de ver
Ascarides	<i>Toxocara canis</i> <i>Toxascaris leonina</i>
Cestodes	<i>Echinococcus granulosus</i> <i>Echinococcus multilocularis</i> <i>Dipylidium caninum</i> <i>Taenia</i> spp. <i>Multiceps multiceps</i> <i>Mesocestoides</i> spp.
Ankylostomes	<i>Uncinaria stenocephala</i> <i>Ancylostoma caninum</i>
Trichocéphales	<i>Trichuris vulpis</i>

- Pour aider à contrôler les protozoaires *Giardia*

## 5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer simultanément avec un autre vermifuge contenant de la pipérazine comme matière active.

L'innocuité de Drontal® Dog Flavour pendant la première et la deuxième partie de la gestation n'a pas été étudiée. Pour cette raison, on déconseille l'utilisation du produit chez les chiennes en gestation pendant les 40 premiers jours de celle-ci. On a démontré l'innocuité d'un traitement unique pendant la troisième partie de la gestation et pendant la lactation, tant pour la chienne que pour ses jeunes. L'utilisation de Drontal® Dog Flavour pour un traitement de 3 jours des infestations à *Giardia* spp. pendant la troisième partie de la gestation ne peut se faire que suivant l'analyse risques/bénéfices réalisée par un vétérinaire.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de très rares cas, de légers symptômes gastro-intestinaux transitoires (p. ex. vomissements ou diarrhées) peuvent se produire.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCE CIBLE

Chien.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

DOSAGE

Un comprimé par 10 kg de poids vif. Cela correspond à 15 mg de fébantel, 14,4 mg d'embonate de pyrantel et 5 mg de praziquantel par kg de poids vif.

#### MODE D'ADMINISTRATION

Les comprimés peuvent être administrés selon l'une des façons suivantes:

- placer le comprimé directement sur la langue au fond de la bouche et faire avaler;
- écraser et mélanger à la nourriture;
- placer le comprimé dans une boulette de viande.

Un régime diététique particulier n'est pas nécessaire.

#### DURÉE DU TRAITEMENT

Pour le traitement des infestations mixtes de nématodes et cestodes: administration unique.

Pour le traitement des infestations de *Giardia* spp.: administration pendant 3 jours consécutifs.

Pour diminuer le risque de réinfection par *Giardia*, il est conseillé également de nettoyer de façon approfondie l'environnement du chien, et de désinfecter le chien, ou de le transférer vers un autre endroit, en particulier dans les chenils.

L'élimination de *Giardia* spp. chez des chiens pris individuellement peut être insuffisante, surtout dans les circonstances où la pression d'infestation est élevée, de sorte qu'un risque potentiel de contamination humaine reste présent.

C'est pourquoi le chien doit être réexaminé, et sur base des résultats, il faut si nécessaire refaire un traitement, selon l'avis du vétérinaire.

### 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-

### 10. TEMPS D'ATTENTE

Pas d'application.

### 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à la date de péremption mentionnée sur l'emballage. La date de péremption se compose des lettres "EXP" (expiration), suivies de 6 chiffres: les deux premiers représentent le mois et les quatre suivants l'année.

### 12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Les puces étant l'hôte intermédiaire, elles sont aussi une source d'infestation par le *Dipylidium*. Pour éviter les réinfestations, traiter en même temps les animaux et leur environnement contre les puces avec un insecticide approprié.

### 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

08/2011

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Délivrance libre.